

Obnova homeostázy u pacientky po onkologické terapii



MUDr. Marta Kučerová, Eva Koppová
Klinický onkolog, Inpharm Clinic, Jesenice u Prahy

Žena, věk 48 let, výška 165 cm, váha 60 kg. Pitný režim 2,5l/den, kuřačka 25 let (10 cigaret denně), káva 2krát denně, alkohol nepije. OA: běžné dětské nemoci, neléčí se s ničím, ledvinové kameny nemá, funkce ledvin dobrá. AA: neudává. NO: základní diagnóza – karcinom prsu vlevo, stp. CCB, histol. ductální adenokarcinom, T1N0M0, klinické stadium I. A, ER +, HER-2 neg. FA: letrozol (Femara) 1-0-0.

Klinický souhrn současného stavu

Karcinom prsu vlevo, histol. ductální adenokarcinom, grade 3, klinické stadium I, T1N0M0. Imunohistochemie: ER +90%, PR +30%, HER-2 neg., Ki67 30%. Stagingová vyšetření (RTG S+P, SONO břicha a scintigrafie skeletu) byla negativní. Stp. segmentektomií levého prsu, SLND (sentinelová uzlina) 31. 7. 2015, pT1a pN0 pM0. Stp. po operační iradiaci a zahájení hormonální léčby inhibítorem aromatázy (Femara).

Subj. – pacientka přichází po operaci a iradiaci, udávala slabost, únavu, cítila se vyčerpaná, trpí nespavostí. Obj. – nález přiměřený, status performance 0. Laboratorní výsledky: ledvinné funkce - urea, kreatinin v normě, JT testy v normě, KO v normě.

Terapie

Indikována infuzní léčba 1krát týdně: vitamin C i.v. v dávce 0,2 g/kg (15g) + Glutathion (TAD) 600 mg i.v. + vitaminy řady B i.v. + aminokyseliny (cystein+metionin) i.v. Od 6. 10. 2015 do 15.12.2015 podáno celkem 8 aplikací v intervalu 1x za týden.

Kontrola 7. 1. 2016 po 8 aplikacích: Pacientka se cítí mnohem lépe, únava vymizela, lépe spí, zlepšena chuť k jídlu a těž psychický stav.

Kontrolní odběry: urea, kreatinin v normě, jaterní testy v normě, KO v normě. Snášenlivost infuzí IVC+TAD+vit.B i.v. byla dobrá, bez komplikací. Pacientka nyní pokračuje v tzv. udržovací léčbě, kdy probíhají aplikace 1krát měsíčně. Po půl roce bude vhodné zopakovat intenzivní cyklus 1krát týdně 4 aplikace.

Zhodnocení léčby

Pacientka se zákl. dg. karcinomu prsu vlevo, klinicky I.A stadium, po onkologické léčbě (iradiaci). Při probíhající hormonální léčbě současně podávána komplementární léčba IVC + TAD + vit.B + aminokyseliny i.v. 1krát týdně 8 aplikací, poté 1krát měsíčně.

Došlo k výraznému zlepšení kvality života, únava a vyčerpanost ustoupily, tolerance i.v. léčby dobrá, bez komplikací. Infuzní podání vybraných vitaminů a biogenních látek s antioxidantními a dalšími podpůrnými účinky tak přispělo k obnově homeostázy a podpoře fyziologických funkcí všech systémů.

