

# Mediální luxace pately



**MVDr. Klára Němcová**  
veterinární ordinace, Tišnov

**Zvíře:** pes

**Plemeno:** maltézský psík

**Pohlaví:** samice Brixí (nekastrovaná)

**Stáří:** 14 měsíců

**Hmotnost:** 4,3 kg

- **Anamnéza:** od 10. měsíce začala fenka nadlehčovat levou pánevní končetinu. Během 4 měsíců se stav natolik zhoršil, že poskakovala téměř stále jen po třech končetinách. Ortopedickým vyšetřením (pal-

pací) byla zjištěna luxace patel obou kolenních kloubů; pravá patela med. lux. 1. stupně a levá patela med. lux. 2. stupně.

- **Diagnóza:** mediální luxace pately obou kolenních kloubů.

## Léčba FRM:

- léčeno pouze levé koleno,
- použitý přípravek MD-Knee, žádné jiné léky nebyly použity,
- dávkování: poprvé 2 ml s. c., další aplikace 1 ml (polovina ampule) s. c. do oblasti kolenního kloubu, střídání stran aplikace (mediálně x laterálně),
- intervaly aplikací: den 1., 4., 10., dále 4 apl. po týdnu,
- MD-Knee byl aplikován sterilní jehlou 0,6 mm, místo aplikace není nutno vyholovat ani dezinfikovat.

Již po první aplikaci se snížila četnost nadlehčování levé končetiny. Po 2. apl. fena zakulhala pouze 2–3krát denně a po 3. apl. kulhání zcela vymizelo. Chodí po všech čtyřech končetinách.

Týden po druhé apl. MD-Knee lze patelu manuálně luxovat, ale obtížně. Týden po 6. aplikaci není možné manuálně patelu luxovat.

Při kontrole měsíc po poslední aplikaci fena nekulhá (nedochází k nadlehčování končetiny). Manuálně lze patelu luxovat. Ze zkušenosti doporučuji klientům tzv. udržovací aplikace Guna MD injekcí (pro dlouhodobé udržení efektu terapie) v intervalu 1–2 měsíce dle závažnosti stavu a reakce pacienta na léčbu.

U Brixí již další aplikace Guna MD injekcí neproběhly. Dnes je fence 6 let, nekulhá (pánevní končetiny nenadlehčuje).

