


Alzheimerova choroba (ACH)



ACH je choroba mozku, nejčastější příčina demence. Patří do skupiny atroficko-degenerativních chorob, některé formy mají familiární výskyt. Presenilní forma začíná před 65. rokem, senilní forma po této hranici. Postižena je zejména cholinergní transmise z oblasti bazálních částí mozku do kůry a hipokampu (významného pro paměť), postiženy jsou i neurony produkující CRF či somatostatin. Morfologické změny nacházíme v neuronech, tzv. tangles, popř. Lewyho tělískách, tvoří se extracelulárně neuritické senilní plaky s prokázanou depozicí amyloidu, kongofilní angiopatie. Patrné je rozšíření komorového systému, atrofie hipokampů. Příčina ACH není známá, jsou popsány mutace některých genů zvyšující riziko vzniku nemoci, mj. apolipoprotein E4.

V klinickém obrazu je přítomna porucha paměti, kognitivní poruchy typu afázie, apraxie, agnozie, poruchy výkonných funkcí, orientace, citů, motivace. Dochází k výraznému narušení fungování postižené osoby v zaměstnání, sociální sféře, k výraznému postižení

osobnosti i v estetické a etické sféře s egocentrismem. Postupně dochází k rozvratu osobnosti, inkontinenci, upoutání na lůžku a úmrtí, obvykle na interkurentní choroby.

Nemoc trvá několik let, rychleji probíhá u familiární a presenilní formy. Diferenciálně diagnosticky je patrný postupný začátek s pomalým, ale plynulým zhoršováním. Léčba je obtížná, nověji se popisují určité pozitivní výsledky zpomalení progresu u časnějších forem. Standardní léčba ACH sestává z inhibitorů cholinesterázy (donepezil, galantamin, rivastigmin) a inhibitorů N-methyl-D-aspartátových receptorů, zde je zastoupena účinná látka memantin. Používají se také nootropika, selegilin, scavengery kyslíkových radikálů aj. Protektivní význam se přisuzuje rovněž estrogenům.

Fyziologická regulační medicína nabízí podpůrnou terapii pomocí vitamínu C, CDP-cholinu, glutathionu, nervových faktorů, specifické imunoterapie.

Odborná redakce Edukafarm

DOPORUČENÝ FRM PROTOKOL

**VITAMIN C INF. 7,5-15g
+TAD (glutathion) i.v.
600-1200mg
1x týdně**

**CITICOLIN INF.
500 – 2000 MG
1-2x týdně dle intenzity
onemocnění**

**LIPO-C-ASKOR liq.
2x denně 5ml (=1g)**

**RISCHIARIL tbl
1 tableta denně**

**DMG-Gold
2x denně 20 kapek**



**GUNA-BDNF
+ GUNA-GERIATRICS:
ráno a v poledne 20 kapek**

Suplementace
vitaminem D
pokud je potřeba

**2LMDA
obsah 1 kapsle vyspat
pod jazyk**



inzerce

RISCHIARIL®



**ZHORŠUJE SE VÁM PAMĚŤ,
KONCENTRACE A MYSLENÍ?**

Pak je pravděpodobné, že Vašemu organismu chybějí některé látky zajišťující normální ochranu a fungování nervových buněk.



doplňek stravy